

---

## *Avant-propos*

Ce document dresse une courte description des services préventifs propres aux femmes. Les deux principaux thèmes abordés sont la mammographie et le test de Papanicolaou (test de PAP). L'hystérectomie sera présentée succinctement en terminant.

Les questions sur la mammographie ont été posées aux femmes de 35 ans et plus. On s'informait, dans un premier temps, si ces dernières avaient déjà passé une mammographie et dans l'affirmative la raison ou les raisons de cette mammographie. On demandait, par la suite, à quand remontait leur dernière mammographie. Finalement, pour celles qui déclaraient que leur dernière mammographie remontait à deux ans ou plus ou n'en avaient jamais eu et qui étaient âgées entre 50 et 69 ans, on s'enquerrait des raisons pour ne pas avoir passé une mammographie au cours des deux dernières années.

La question sur le test de PAP a été posée aux femmes de 18 ans et plus. Toutefois, les données présentées ne concernent que les femmes de 20 ans et plus. L'enquêteur demandait à ces femmes si elles avaient déjà passé un test de PAP. Dans l'affirmative, on voulait savoir à quand remontait la dernière fois. Finalement, pour celles n'ayant pas eu de test PAP depuis trois ans et plus ou qui n'avaient jamais eu ce test, on s'informait des raisons pour ne pas avoir passé le test.

Le questionnaire demandait aux femmes de 15-49 ans si elles étaient enceintes. Puis, à l'ensemble des femmes de 18 ans et plus, si elles avaient subi une hystérectomie. Des réponses à ces deux questions, on obtient le nombre de femmes de 20 ans et plus ayant une hystérectomie.

## **I - La mammographie**

### **Temps écoulé depuis la dernière mammographie**

Plus du tiers des femmes âgées de 35 ans et plus n'ont jamais eu de mammographie dans la région (36 %). Près d'une femme sur quatre (24 %) a eu sa dernière mammographie il y a plus de deux ans (24 %) et 40 % depuis moins de deux ans (tableau 1). Malgré les écarts parfois sensibles de proportions, aucune différence statistiquement significative n'est notée avec le Québec.

<b>Tableau 1</b>				
<b>Temps écoulé depuis la dernière mammographie selon l'âge, femmes de 35 ans ou plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 2003</b>				
	Région		Province	
	%	IC	%	IC
<b>Total</b>				
Moins de 2 ans	39,7	34,0 – 45,4	44,5	42,8 – 46,3
2 ans ou plus	23,9	18,9 – 28,8	24,1	22,6 – 25,6
Jamais	36,4	30,8 – 42,0	31,4	29,8 – 33,0
<b>35 à 39 ans</b>				
Moins de 2 ans	**n.p.		8,5	6,1 – 11,6
2 ans ou plus	**n.p.		14,0	10,9 – 17,7
Jamais	85,6	68,7 – 95,4	77,5	73,5 – 81,4
<b>40 à 49 ans</b>				
Moins de 2 ans	<b>*12,7</b>	6,5 – 21,6	26,3	23,5 – 29,2
2 ans ou plus	<b>*26,1</b>	17,2 – 36,6	27,1	24,3 – 30,0
Jamais	<b>61,2</b>	50,9 – 71,5	46,6	43,3 – 49,8
<b>50 à 69 ans</b>				
Moins de 2 ans	74,6	65,5 – 82,4	72,8	70,4 – 75,2
2 ans ou plus	*16,8	10,4 – 25,1	17,5	15,5 – 19,6
Jamais	*8,6	4,1 – 15,4	9,7	8,1 – 11,4
<b>70 ans ou plus</b>				
Moins de 2 ans	*27,7	16,5 – 41,3	36,2	32,2 – 40,2
2 ans ou plus	47,4	34,2 – 60,7	42,0	37,9 – 46,1
Jamais	*24,9	14,3 – 38,3	21,8	18,3 – 25,2

\* Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence

\*\* Coefficient de variation > 33,3 %, données non publiées

Les valeurs en gras indiquent des différences statistiquement significatives

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1

Le pourcentage de femmes n'ayant jamais eu de mammographie est associé à l'âge. Ainsi, cette proportion diminue de 86 %, chez les femmes de 35–39 ans, à 9 % chez celles de 50–69 ans qui constitue la population visée par le *Programme québécois de dépistage du cancer du sein*. Quant aux femmes de 70 ans et plus, 25 % d'entre elles n'ont jamais eu de mammographie. Les différences de proportions selon l'âge observées avec le Québec ne sont généralement pas significatives, sauf à 40–49 ans où les femmes de la région sont plus nombreuses à n'avoir jamais eu de mammographie comparativement aux Québécoises du même âge (61 % contre 47 %). En contrepartie, moins de femmes de cet âge de la région ont eu une mammographie au cours des deux années précédentes (13 % contre 26 %).

Il est à noter que le profil des femmes de 50–69 ans se compare à celui du Québec. Il n'en reste pas moins que près d'une femme sur quatre (25 %) à cet âge n'a pas eu une mammographie récemment. Chez les femmes de 70 ans et plus, 72 % n'ont pas eu une mammographie au cours des deux dernières années.

### Les raisons invoquées pour avoir passé une mammographie

Toutes les informations ne sont pas disponibles pour la région quant aux raisons invoquées pour avoir déjà passé une mammographie (tableau 2). Toutefois, les valeurs observées disponibles se comparent

entre la région et le Québec, l'examen régulier ou de dépistage allant chercher près de 60 % des femmes de 35 ans et plus.

<b>Tableau 2</b>				
<b>Raisons invoquées pour avoir déjà passé une mammographie, femmes de 35 ans ou plus, Mauricie et Centre-du-Québec, 2003</b>				
	<b>Région</b>		<b>Province</b>	
	<b>%</b>	<b>IC</b>	<b>%</b>	<b>IC</b>
Antécédents familiaux	*12,1	7,7 – 17,8	11,0	9,7 – 12,3
Examen régulier ou dépistage	59,1	51,9 – 66,3	59,7	57,6 – 61,7
Âge	**n.p.		14,0	12,6 – 15,5
Masse dépistée lors d'une visite précédente	*10,6	6,5 – 16,1	13,6	12,2 – 15,1
Suivi d'un traitement	** n.p.		2,8	2,1 – 3,6
Problème mammaire	** n.p.		4,7	3,8 – 5,6

\* Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence

\*\* Coefficient de variation > 33,3 %, données non publiées

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1

Les données québécoises permettent de connaître certaines raisons invoquées pour passer une mammographie selon l'âge. Ainsi, au Québec, les antécédents familiaux sont davantage avancés de 35 à 49 ans, de même qu'une masse dépistée lors d'une visite précédente. L'âge ou l'examen régulier de dépistage sont plus fréquemment mentionnés par les femmes de 50 ans et plus. Les données régionales quant aux raisons invoquées sont disponibles selon l'âge pour l'examen régulier de dépistage. On constate la même tendance selon l'âge qu'au Québec. De même, la raison de la masse dépistée lors d'une visite précédente suit aussi, quoique de manière statistiquement non significative, la tendance québécoise par âge (tableau 3).

<b>Tableau 3</b>				
<b>Raisons choisies pour avoir passé une mammographie, femmes de 35 ans ou plus ayant subi une mammographie, Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2003</b>				
	<b>Région</b>		<b>Province</b>	
	<b>%</b>	<b>IC</b>	<b>%</b>	<b>IC</b>
<b>Examen régulier ou dépistage</b>				
Oui	59,1	51,9 – 66,3	59,7	57,6 – 61,7
35 à 49 ans	*33,0	18,7 – 50,1	38,3	34,4 – 42,3
50 ans ou plus	66,1	58,3 – 73,9	67,5	65,2 – 69,8
<b>Masse dépistée lors d'une visite précédente</b>				
Oui	*10,6	6,5 – 16,1	13,6	12,2 – 15,1
35 à 49 ans	*21,1	9,6 – 37,3	26,8	23,2 – 30,4
50 ans ou plus	*7,8	4,0 – 13,5	8,8	7,4 – 10,2

\* Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1

## Les raisons invoquées pour ne pas avoir passé de mammographie

Les raisons avancées pour ne pas avoir passé de mammographie ne sont pas disponibles pour la région. Au Québec, parmi les 27 % de femmes de 50–69 ans n'ayant pas passé de mammographie depuis deux ans ou plus, les raisons les plus mentionnées sont, en premier lieu, que ce n'était pas nécessaire selon la répondante (57 %) ou encore qu'elle n'a pas eu le temps de s'en occuper (19 %). Les femmes de 50–59 ans et de 60–69 ans n'affichent guère de différence à cet égard.

## II – Le test de PAP

### Temps écoulé depuis le dernier test de PAP

Les femmes de 20 ans et plus de la région semblent un peu plus nombreuses que les Québécoises du même âge à n'avoir jamais passé un test de PAP (21 % contre 16 %). Cette différence, sans être statistiquement significative, semble se faire essentiellement au détriment des durées de moins d'un an depuis le dernier test. Si on regroupe les périodes « trois ans et plus » et « jamais » plus d'une femme sur trois (38 %) n'a pas eu de test de PAP au cours des trois dernières années (tableau 4).

<b>Tableau 4</b>				
<b>Temps écoulé depuis le dernier test de Pap, femmes de 20 ans ou plus, Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2003</b>				
	<b>Région</b>		<b>Province</b>	
	<b>%</b>	<b>IC</b>	<b>%</b>	<b>IC</b>
Moins de 1 an	42,1	37,0 – 47,1	46,1	44,6 – 47,6
1 an à moins de 3 ans	19,5	15,6 – 24,0	20,4	19,2 – 21,6
3 ans ou plus	17,5	13,7 – 21,8	17,3	16,1 – 18,4
Jamais	<b>21,0</b>	16,8 – 25,2	16,3	15,2 – 17,4

\* Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence


Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1

Les données selon l'âge quant au temps écoulé depuis le dernier test de PAP ne sont pas disponibles pour la région. Toutefois, au Québec comme l'indique la figure 1, ce sont les femmes de 35 à 64 ans qui sont les moins nombreuses à n'avoir jamais passé un test de PAP (13 % des femmes), les femmes de 20–34 ans et de 65–69 connaissent des proportions comparables (17 % et 18 %). Avec près d'une femme sur trois, celles de 70 ans et plus sont, proportionnellement, les plus nombreuses à n'avoir jamais passé ce test.

Il convient de signaler, au passage, la plus forte proportion des femmes de 20–34 ans à n'avoir jamais passé le test par rapport à celles de 35–64 ans. Malgré tout, les femmes de 20–34 ans demeurent celles qui ont, en plus forte proportion, subi un test de PAP au cours de la dernière année (58 %). Cette proportion diminue par la suite avec l'âge, d'abord lentement, puis plus rapidement au-delà de 64 ans. En contrepartie, la proportion de femmes ayant passé le test il y a trois ans et plus augmente avec l'âge. La proportion de femmes ayant passé le test de un à trois ans auparavant reste stable entre 20 et 69 ans (21 % ou 22 %) pour diminuer chez celles de 70 ans et plus.

Ainsi, on constate au Québec, que 21 % des femmes de 20–34 ans, 25 % des femmes de 35–44 ans et 32 % des femmes de 45–64 ans n’ont pas eu de test de PAP depuis au moins trois ans.

**Figure 1**  
**Temps écoulé depuis le dernier test de Pap selon l’âge,**  
**femmes de 20 ans ou plus, Québec, 2003**



Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1

Au chapitre des raisons invoquées pour ne pas avoir passé le test au cours des trois dernières années, aucune différence n’est observée entre la région et la province quant à celles mentionnées (tableau 5). Ainsi, plus de la moitié des femmes de 20 ans et plus (52 %) estiment, selon elles, que ce n’est pas nécessaire, loin devant l’hystérectomie (19 %). Seulement 11 % de ces femmes mentionnent que ce n’est pas nécessaire selon le médecin.

Au Québec, ce sont les femmes de 20–34 ans qui ont le plus répondu que ce n’était pas nécessaire selon elles. Les réponses que ce n’était pas nécessaire selon le médecin ou qu’elles avaient subi une hystérectomie sont davantage rapportées par les femmes plus âgées.

	Région		Province	
	%	IC	%	IC
N'a pas eu l'occasion de s'en occuper	*10,9	6,2 – 17,4	12,8	11,0 – 14,5
Pas nécessaire selon la répondante	52,2	43,8 – 60,5	51,9	49,3 – 54,6
Pas nécessaire selon le médecin	*11,1	6,4 – 17,6	11,3	9,7 – 13,0
Hystérectomie	*19,4	13,1 – 27,0	17,8	15,8 – 19,8
N'aime pas se soumettre à ce test	** n.p.		*1,7	1,1 – 2,5

\* Coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 %, interpréter avec prudence

\*\* Coefficient de variation > 33,3 %, données non publiées

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1

### III – L’hystérectomie

La proportion de femmes ayant subi une hystérectomie s’élève à 23 % dans la région. Cette proportion ne s’éloigne pas façon statistiquement significative de celle du Québec (tableau 6).

Les données sur l’hystérectomie selon l’âge ne sont pas disponibles pour la région. On notera pour l’ensemble du Québec, que près de 41 % des femmes de 65 ans et plus ont subi une hystérectomie contre 28 % des femmes de 45–64 ans et 10 % des femmes de 35–44 ans.

<b>Tableau 6</b>				
<b>Population ayant subi une hystérectomie, femmes de 20 ans ou plus, Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 2003</b>				
	Région		Province	
	%	IC	%	IC
A subi une hystérectomie	23,3	[18,9–27,6]	19,6	[18,4–20,8]

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cycle 2.1

#### Faits saillants

- Plus du tiers des femmes âgées de 35 ans et plus n’ont jamais eu de mammographie dans la région (36 %). Près d’une femme sur quatre (24 %) a eu sa dernière mammographie il y a plus de deux ans (24 %) et 40 % depuis moins de deux ans.
- Les femmes de 50–69 ans sont celles qui en moins grande proportion n’ont jamais eu de mammographie (9 %). Toutefois, cette proportion ajoutée à celle se rapportant aux femmes dont la dernière mammographie remonte à deux et plus fait en sorte que 25 % des femmes de cet âge n’ont pas eu de mammographie depuis moins de deux ans.
- Un plus grand nombre de femmes de 40–49 ans n’ont jamais eu de mammographie dans la région comparativement au Québec (61 % contre 47 %).
- Près de 57 % des femmes de 50–69 ans n’ayant pas passé de mammographie depuis deux ans ou plus mentionnent que ce n’était pas nécessaire selon elles.
- Les femmes de 20 ans et plus de la région semblent un peu plus nombreuses que les Québécoises du même âge à n’avoir jamais passé un test de PAP (21 % contre 16 %).
- Plus d’une femme sur trois (38 %) n’a pas eu de test de PAP depuis moins de trois ans.
- Les femmes de 20–34 ans demeurent, au Québec, celles qui ont subi un test de PAP au cours de la dernière année en plus forte proportion (58 %). Malgré tout, une proportion légèrement plus importante d’entre elles n’ont jamais passé ce test comparativement aux femmes de 35–64 ans (17 % contre 13 %).

- Les femmes de 20–34 ans n'ayant pas passé le test de PAP depuis trois ans sont aussi celles qui mentionnent le plus comme raison que ce n'est pas nécessaire selon elles.
- Près de 23 % des femmes de 20 ans et plus de la région ont subi une hystérectomie.

**Yves Pepin**

Agent de planification/programmation et recherche